

La suite spectrale de Cibils pour la cohomologie des algèbres triangulaires

Sophie Dourlens

Laboratoire J.A. Dieudonné
Université de Nice Sophia-Antipolis
Parc Valrose
06108 Nice Cedex 2
dourlens@math.unice.fr

Résumé

Pour étudier la cohomologie de Hochschild d'algèbres triangulaires $\mathcal{T}$, nous construisons une suite spectrale, dont les termes sont paramétrés par la longueur des trajectoires du carquois associé à $\mathcal{T}$, et qui converge vers $HH^*(\mathcal{T})$. Nous en explicitons les composantes, et les différentielles au premier niveau qui s'écrivent comme des sommes de produits cup. Dans le cas $n = 3$, nous étudions les propriétés de la différentielle au niveau 2. Enfin, nous appliquons ces résultats à l'algèbre des chemins d'un carquois sans cycles orientés et les relient à des résultats antérieurs sur l'algèbre d'incidence d'un complexe simplicial, et plus généralement sur l'algèbre des morphismes de certaines catégories.

1 Introduction

D'après Hochschild-Konstant-Rosenberg, si A est l'algèbre des fonctions régulières sur une variété affine V (en caractéristique 0), la cohomologie de Hochschild de A calcule les sections globales du faisceau des champs de multi-vecteurs sur V . Plus généralement, les invariants (co)homologiques de l'algèbre A permettent de décrire de nombreuses propriétés géométriques de V . L'idée de la géométrie non commutative est d'étendre ce type de résultats au cadre d'algèbres non commutatives. On pourra se référer, par exemple, à l'introduction de l'article de Nest et Tsygan [NT] pour un aperçu synthétique sur ces questions. Un cas particulièrement intéressant d'algèbres non commutatives est celui des algèbres triangulaires, qui jouent, dans ce contexte (au moins si leur sous-algèbre diagonale est commutative), le rôle que jouent les algèbres de Lie nilpotentes en théorie des algèbres de Lie. Comme nous le verrons, les propriétés de nilpotence des algèbres de Lie triangulaires se reflètent d'ailleurs dans la suite spectrale de la cohomologie de Hochschild d'algèbres triangulaires, introduite et étudiée dans cet article.

Ces groupes de cohomologie ont été très étudiés récemment dans le cas d'algèbres de taille 2 [C1, CMRS, GG, MP]. Rappelons en particulier les résultats de Cibils [C1] : la cohomologie de l'algèbre $\mathcal{T} = \begin{pmatrix} A_1 & \\ M_1 & A_2 \end{pmatrix}$ est reliée à la cohomologie de Hochschild de $A = A_1 \times A_2$ et aux groupes d'extension de M par une suite exacte longue de cohomologie. De plus, le morphisme de connexion s'exprime comme un produit cup.

Nous généralisons ici la méthode de Cibils aux algèbres triangulaires de tailles supérieures. Rappelons tout d'abord la construction d'une telle algèbre. Soient $A_1, \dots, A_n$ des algèbres unitaires sur un corps k , et soit, pour tous $1 \leq i < j \leq n$, un A_j - A_i -bimodule non nul noté ${}_jM_i$. On suppose que la collection de bimodules $\{{}_jM_i\}$ est munie de morphismes $\mu_{l,j,i}$:

${}_l M_j \otimes_j M_i \longrightarrow {}_l M_i$ pour tous $1 \leq i < j < l \leq n$ (le symbole $\otimes$ désignant le produit tensoriel sous k), tels que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc}
{}_m M_l \otimes {}_l M_j \otimes {}_j M_i & \xrightarrow{1_m M_l \otimes \mu_{l,j,i}} & {}_m M_l \otimes {}_l M_i \\
\downarrow \mu_{m,l,j} \otimes 1_{j M_i} & \circlearrowleft & \downarrow \mu_{m,l,i} \\
{}_m M_j \otimes {}_j M_i & \xrightarrow{\mu_{m,j,i}} & {}_m M_i
\end{array}$$

soient commutatifs, quels que soient $1 \leq i < j < l < m \leq n$. L'algèbre triangulaire $\mathcal{T}$ associée à ces bimodules est

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} A_1 & & & & & \\ {}_2 M_1 & A_2 & & & & \\ {}_3 M_1 & {}_3 M_2 & A_3 & & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \\ {}_n M_1 & {}_n M_2 & \cdots & \cdots & {}_n M_{n-1} & A_n \end{pmatrix},$$

la somme et le produit de deux éléments étant donnés par la somme et le produit des matrices carrées usuelles. La structure multiplicative de $\mathcal{T}$ est donnée par les morphismes $\mu_{l,j,i}$, et la commutativité des diagrammes ci-dessus garantit l'associativité du produit de $\mathcal{T}$. Un cas particulier d'algèbres triangulaires est celui des *algèbres triangulaires tensorielles* : les modules ${}_{i+\alpha} M_i$ pour $\alpha \geq 2$ sont alors les produits tensoriels ${}_{i+\alpha} M_{i+\alpha-1} \otimes_{A_{i+\alpha-1}} \cdots \otimes_{A_{i+1}} {}_{i+1} M_i$. Le rôle des morphismes $\mu_{l,j,i}$ est tenu dans ce cas par les surjections canoniques ${}_l M_j \otimes_k {}_j M_i \twoheadrightarrow {}_l M_j \otimes_{A_j} {}_j M_i$, et l'associativité du produit de $\mathcal{T}$ résulte de l'associativité du produit tensoriel.

Suivant [C1], pour étudier la cohomologie d'une algèbre triangulaire $\mathcal{T}$ de taille n , nous utiliserons son *carquois*, qui est de la forme

$$\mathcal{Q} : \quad e_1 \longrightarrow e_2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow e_n.$$

Les sommets de $\mathcal{Q}$ correspondent aux k -algèbres A_i , les flèches aux bimodules ${}_{i+1} M_i$, et les chemins de longueur α ($\alpha \geq 2$) aux bimodules ${}_{i+\alpha} M_i$. La cohomologie de Hochschild de $\mathcal{T}$ s'exprime alors à l'aide d'un complexe de Hochschild relatif [GS1], dont les composantes sont paramétrées par les *trajectoires* du carquois $\mathcal{Q}$ de $\mathcal{T}$. Cette paramétrisation induit une filtration du complexe par la *longueur* des trajectoires de $\mathcal{Q}$, et donc une suite spectrale, qui converge vers la cohomologie de Hochschild de $\mathcal{T}$. Le propos de cet article est d'étudier et de décrire cette suite spectrale (au-delà du cas 2×2 qui, on l'a dit, a déjà été amplement étudié). Comme on pouvait l'espérer, les différentielles au niveau 1 s'expriment à nouveau, dans le cas général, comme des produits *cup*. Dans le cas des algèbres triangulaires tensorielles de taille 3, nous montrons que la différentielle au niveau 2 a des composantes nulles ; nous décrivons un cas particulier dans lequel la suite spectrale dégénère au niveau 2.

Nous appliquons enfin ces résultats à l'algèbre des chemins d'un carquois sans cycles orientés, qui est triangulaire. Nous explicitons sur un exemple de carquois le calcul de la suite spectrale. Si le carquois provient d'un complexe simplicial, nous retrouvons un résultat de Cibils [C2]. D'autre part, en considérant un carquois comme une catégorie, nous complétons des résultats de Bendifallah et Guin [BG] sur la cohomologie de certaines catégories.

2 Cohomologie de Hochschild relative

La clé du calcul de la cohomologie de Hochschild d'une algèbre triangulaire est la détermination d'un complexe plus petit que le complexe de Hochschild classique, dont la cohomologie est la cohomologie de Hochschild de l'algèbre triangulaire. Nous donnons dans cette section la construction d'un tel complexe, qui s'interprète comme un complexe de Hochschild relatif [GS1].

Soit $\mathcal{T}$ l'algèbre triangulaire définie dans l'introduction. Les algèbres A_i étant supposées unitaires, $\mathcal{T}$ a une sous-algèbre remarquable

$$R = \begin{pmatrix} k & & \\ & \ddots & \\ & & k \end{pmatrix}.$$

Pour $i = 1 \dots, n$, on note $e_i \in R$ l'image de 1_{A_i} par l'injection $A_i \hookrightarrow \mathcal{T}$. Ces éléments forment un système $\{e_1, \dots, e_n\}$ d'idempotents orthogonaux, tel que $\sum_i e_i = 1_{\mathcal{T}}$. De plus, ce système est une k -base de R : tout élément r de R s'écrit de manière unique $r = r(\sum_i e_i) = \sum_i r e_i = \sum_i r_i e_i$, où les r_i sont des éléments de k . Soit $R^e = R \otimes_k R^{op}$ l'algèbre enveloppante de R . Cette algèbre possède un élément remarquable e , défini par :

$$e := \sum_{i=1}^n e_i \otimes e_i^{op}.$$

Lemme 2.1 *Pour tout morphisme de $\mathcal{T}$ -bimodules $f : X \longrightarrow Y$, il existe $\sigma : Y \longrightarrow X$ R -linéaire tel que $f\sigma f = f$.*

PREUVE. Soit la décomposition canonique de f en une surjection suivie d'une injection $f : X \xrightarrow{p} \text{Im } f \xrightarrow{i} Y$. Comme k est un corps, la surjection p admet une section k -linéaire, et l'injection i admet une rétraction k -linéaire. La composée de ces deux applications donne une application k -linéaire $\sigma : Y \longrightarrow X$ telle que $f\sigma f = f$. Nous allons construire à partir de σ une application σ' R -linéaire ayant la même propriété. Pour cela, notons $S = R^e$, et considérons l'automorphisme de S^e suivant :

$$\begin{aligned} S^e = R \otimes R^{op} \otimes R^{op} \otimes R &\xrightarrow{\cong} R \otimes R^{op} \otimes R^{op} \otimes R = S^e \\ p \otimes q^{op} \otimes r^{op} \otimes s &\longmapsto p \otimes r^{op} \otimes q^{op} \otimes s. \end{aligned}$$

Soit e_S l'image de $e \otimes e^{op}$ par cet automorphisme. Précisément, e_S s'écrit

$$e_S = \sum_{i,j=1}^n e_i \otimes e_j^{op} \otimes e_i^{op} \otimes e_j.$$

Remarquons que $\text{Hom}_k(Y, X)$ a une structure de S^e -module à gauche : si $\sigma \in \text{Hom}_k(Y, X)$, et $p, q, r, s \in R$, alors l'action de $(p \otimes q^{op} \otimes r^{op} \otimes s)$ sur σ est donnée par

$$\begin{aligned} (p \otimes q^{op} \otimes r^{op} \otimes s) \cdot \sigma : Y &\longrightarrow X \\ y &\longmapsto p(\sigma(rys))q. \end{aligned}$$

Posons alors $\sigma' = e_S \cdot \sigma$. D'une part, σ' est un morphisme de R -bimodules : en effet, pour $r, s \in R$, et $y \in Y$, la décomposition de r et s dans la base $\{e_1, \dots, e_n\}$ et la k -linéarité de σ

permettent d'écrire

$$\begin{aligned}\sigma'(rys) &= \sum_{i,j=1}^n e_i \sigma(e_i r y s e_j) e_j = \sum_{i,j=1}^n e_i \sigma(r_i e_i y e_j s_j) e_j = \sum_{i,j=1}^n e_i r_i \sigma(e_i y e_j) s_j e_j \\ &= \sum_{i,j=1}^n r e_i \sigma(e_i y e_j) e_j s = r \left(\sum_{i,j=1}^n e_i \sigma(e_i y e_j) e_j \right) s = r \sigma'(y) s.\end{aligned}$$

D'autre part, σ' vérifie la propriété demandée, à savoir $f\sigma'f = f$: en effet, comme f est un morphisme de $\mathcal{T}$ -bimodules, il commute en particulier avec les e_i ; on a ainsi pour $x \in X$

$$\begin{aligned}f\sigma'f(x) &= f\left(\sum_{i,j=1}^n e_i \sigma(e_i f(x) e_j) e_j\right) = \sum_{i,j=1}^n e_i f(\sigma(f(e_i x e_j))) e_j \\ &= \sum_{i,j=1}^n e_i f(e_i x e_j) e_j = \sum_{i,j=1}^n e_i f(x) e_j = \left(\sum_{i=1}^n e_i\right) f(x) \left(\sum_{j=1}^n e_j\right) = f(x). \diamond\end{aligned}$$

Proposition 2.2 *Le complexe suivant*

$$\dots \rightarrow \mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+2} \xrightarrow{d_l} \mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow \mathcal{T} \otimes_R \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{T} \rightarrow 0$$

avec la différentielle

$$d_l(t_1 \otimes \dots \otimes t_{l+2}) = \sum_{i=1}^{l+1} (-1)^i t_1 \otimes \dots \otimes t_i t_{i+1} \otimes \dots \otimes t_{l+2}$$

est une résolution projective de $\mathcal{T}$ par des $\mathcal{T}$ -bimodules.

PREUVE. Tout d'abord, on a une homotopie

$$\begin{aligned}s_l : \quad \mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+1} &\longrightarrow \mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+2} \\ t_1 \otimes \dots \otimes t_{l+1} &\longmapsto 1 \otimes t_1 \otimes \dots \otimes t_{l+1},\end{aligned}$$

qui donne l'exactitude du complexe. Il reste donc à montrer que $\mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+2}$ est projectif pour $l \geq 0$. Soient, dans la catégorie des $\mathcal{T}$ -bimodules, un morphisme surjectif $\pi : X \twoheadrightarrow Y$ et un morphisme $f : \mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+2} \rightarrow Y$. Il s'agit de montrer qu'il existe $F : \mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+2} \rightarrow X$ faisant commuter le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+2} & \\ & \downarrow f & \\ \exists? F \nearrow & \circlearrowleft & \\ X & \xrightarrow{\pi} Y & \longrightarrow 0\end{array}$$

Or, d'après la relation d'adjonction

$$\text{Hom}_{\mathcal{T}-\mathcal{T}}(\mathcal{T}^{\otimes_{R^l}+2}, Y) \cong \text{Hom}_{R-R}(\mathcal{T}^{\otimes_{R^l}}, Y),$$

le diagramme précédent induit dans la catégorie des R -bimodules un nouveau diagramme :

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{T}^{\otimes_R^l} & \\ & \downarrow \bar{f} & \\ X & \xrightarrow{\pi} Y & \longrightarrow 0\end{array}$$

D'après le lemme 2.1, il existe un morphisme de R -bimodules $\sigma : Y \rightarrow X$ tel que $\pi\sigma\pi = \pi$. Comme π est surjectif, cette égalité devient $\pi\sigma = id_Y$. Le morphisme $\overline{F} = \sigma\overline{f}$ fait donc commuter le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathcal{T}^{\otimes_R l} & \\
 & \downarrow \overline{f} & \\
 X & \xrightarrow[\sigma]{\pi} Y & \longrightarrow 0
 \end{array}$$

(Le diagramme est un triangle commutatif avec une flèche diagonale pointillée $\overline{F} : X \rightarrow \mathcal{T}^{\otimes_R l}$ et un cercle autour de la flèche π .)

En appliquant à nouveau la relation d'adjonction, on obtient le morphisme de $\mathcal{T}$ -bimodules $F : \mathcal{T}^{\otimes_R l+2} \rightarrow X$ qui donne la projectivité de $\mathcal{T}^{\otimes_R l+2}$. $\diamond$

Corollaire 2.3 *Le complexe suivant*

$$\mathcal{H} : \quad 0 \rightarrow X^R \rightarrow \text{Hom}_{R-R}(\mathcal{T}, X) \rightarrow \dots \rightarrow \text{Hom}_{R-R}(\mathcal{T}^{\otimes_R l}, X) \xrightarrow{\delta_l} \dots$$

avec le cobord :

$$\delta_1 x(t) = tx - xt$$

$$\begin{aligned}
 \delta_l f(t_1 \otimes \dots \otimes t_{l+1}) &= t_1 f(t_2 \otimes \dots \otimes t_{l+1}) \\
 &+ \sum_{i=1}^l (-1)^i f(t_1 \otimes \dots \otimes t_i t_{i+1} \otimes \dots \otimes t_{l+1}) \\
 &+ (-1)^{l+1} f(t_1 \otimes \dots \otimes t_l) t_{l+1}.
 \end{aligned}$$

calcule $HH^*(\mathcal{T}, X)$.

PREUVE. Il suffit d'appliquer le foncteur $\text{Hom}_{\mathcal{T}-\mathcal{T}}(-, X)$ à la résolution projective de $\mathcal{T}$ donnée par la proposition précédente, puis d'utiliser les relations

$$\begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{T}-\mathcal{T}}(\mathcal{T}^{\otimes_R l+2}, X) \cong \text{Hom}_{R-R}(\mathcal{T}^{\otimes_R l}, X) & \forall l > 0, \\ \text{Hom}_{\mathcal{T}-\mathcal{T}}(\mathcal{T} \otimes_R \mathcal{T}, X) \cong X^R. & \diamond \end{cases}$$

Remarque 2.4 Les résultats de cette section sont un cas particulier d'une théorie de cohomologie relative développée par Gerstenhaber et Schack [GS1] (section 1). Nous avons en fait construit le complexe de Hochschild de $\mathcal{T}$ *relatif* à la sous-algèbre R . La résolution donnée à la proposition 2.2 est une résolution projective de $\mathcal{T}$ *relativement* à R , ou résolution R -projective de $\mathcal{T}$. Les propriétés de l'élément $e \in R^e$ font de R une algèbre *séparable* ; c'est pourquoi une résolution R -projective de $\mathcal{T}$ est en fait une résolution projective de $\mathcal{T}$ (lemme 2.1). Ainsi, la cohomologie du complexe relatif coïncide avec la cohomologie de Hochschild de $\mathcal{T}$. Cibils a donné dans [C1] une autre démonstration de la proposition 2.2, sans utiliser la notion de cohomologie relative de Gerstenhaber et Schack.

3 Le carquois d'une algèbre triangulaire

Le but de cette section est de fournir une paramétrisation des termes de la résolution projective donnée dans la section précédente (proposition 2.2). Pour cela, nous allons rappeler la notion de carquois dans le cas d'une algèbre triangulaire tensorielle [C1], puis l'adapter dans le cas d'une algèbre triangulaire quelconque.

Définition 3.1 Soit A un anneau. Un système Q_0 d'idempotents centraux de A est un ensemble fini d'idempotents non nuls, centraux, orthogonaux, tel que $\sum_{e \in Q_0} e = 1$. Le carquois d'un A -bimodule M non nul associé à Q_0 est un graphe orienté dont les sommets sont les éléments de Q_0 ; il existe une flèche entre le sommet e et le sommet e' si et seulement si $e'Me \neq 0$.

Soit $\mathcal{T}$ l'algèbre triangulaire tensorielle de taille n définie dans l'introduction. On pose $M = {}_2M_1 \oplus \dots \oplus {}_nM_{n-1}$, et $A = A_1 \times \dots \times A_n$. M possède naturellement une structure de A -bimodule, induite par les actions de A_{i+1} et A_i sur chaque ${}_{i+1}M_i$, et l'action nulle pour les autres facteurs de A . A possède un système naturel d'idempotents centraux $Q_0 = \{e_1, \dots, e_n\}$, les e_i ayant été définis précédemment comme les images de 1_{A_i} par l'injection $A_i \hookrightarrow A$. Le carquois de M par rapport à Q_0 est

$$e_1 \longrightarrow e_2 \longrightarrow \dots \longrightarrow e_n.$$

Nous ferons référence à ce carquois comme le *carquois de l'algèbre $\mathcal{T}$* . Les k -algèbres A_i correspondent aux sommets e_i du carquois, les bimodules ${}_{i+1}M_i$ correspondent aux flèches, et les produits tensoriels de la forme ${}_{k+\alpha}M_{k+\alpha-1} \otimes_{A_{k+\alpha-1}} \dots \otimes_{A_{k+1}} {}_{k+1}M_k$ correspondent aux chemins de longueur α dans le carquois.

Définition 3.2 Une l -trajectoire d'un carquois $\mathcal{Q}$ est une suite $(\gamma_l, \dots, \gamma_1)$ de l chemins consécutifs de $\mathcal{Q}$, sans restriction sur la longueur des chemins (les sommets du carquois, qui sont des chemins de longueur nulle, peuvent être inclus dans la composition d'une trajectoire). On appelle longueur d'une l -trajectoire le nombre de chemins de longueur non nulle qui la composent. On note $|\tau|$ la longueur de la l -trajectoire τ ; on a $0 \leq |\tau| \leq l$.

L'ensemble des l -trajectoires est noté $TR_l(\mathcal{Q})$. Nous reprenons les notations de Cibils [C1] associées au carquois $\mathcal{Q}$ d'un A -bimodule M :

- pour chaque sommet e de $\mathcal{Q}$, on pose $M_e = Ae$ (c'est une sous-algèbre de A) ;
- si a est une flèche de $\mathcal{Q}$, on pose $M_a = t(a)Ms(a)$, où $t(a)$ et $s(a)$ désignent respectivement le but et la source de la flèche a ; M_a est non nul par définition des flèches de $\mathcal{Q}$;
- si $\gamma = a_p \dots a_1$ est un chemin de $\mathcal{Q}$, alors on pose $M_\gamma = M_{a_p} \otimes_{As(a_p)} \dots \otimes_{At(a_1)} M_{a_1}$;
- enfin, si $\tau = (\gamma_l, \dots, \gamma_1)$ est une l -trajectoire, alors on pose $M_\tau = M_{\gamma_l} \otimes_k \dots \otimes_k M_{\gamma_1}$.

Soient A une k -algèbre munie d'un système d'idempotents centraux Q_0 , et M un A -bimodule de carquois $\mathcal{Q}$ associé à Q_0 . D'après un résultat de Cibils [C1], si $R = \prod_i k e_i$ est la sous- k -algèbre de A engendrée par Q_0 , et si $T_A(M)$ est l'algèbre tensorielle de M sous A , alors la l^e puissance tensorielle de $T_A(M)$ sous R se décompose selon les l -trajectoires de $\mathcal{Q}$:

$$\left(T_A(M)\right)^{\otimes_R l} = \bigoplus_{\tau \in TR_l(\mathcal{Q})} M_\tau.$$

La proposition suivante permet d'appliquer ce résultat à l'algèbre triangulaire tensorielle $\mathcal{T}$.

Proposition 3.3 Si $A = A_1 \times \dots \times A_n$, et $M = {}_2M_1 \oplus \dots \oplus {}_nM_{n-1}$, alors les algèbres $\mathcal{T}$ et $T_A(M)$ sont isomorphes.

PREUVE. On a, par définition de l'action de A sur M :

$$M \otimes_A M = \left(\bigoplus_{i=1}^{n-1} {}_{i+1}M_i \right) \otimes_A \left(\bigoplus_{i=1}^{n-1} {}_{i+1}M_i \right) = \bigoplus_{i,j=1}^{n-1} {}_{j+1}M_j \otimes_A {}_{i+1}M_i,$$

et

$${}_{j+1}M_j \otimes_A {}_{i+1}M_i = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq i+1, \\ {}_{i+2}M_{i+1} \otimes_{{}_{A_{i+1}}} {}_{i+1}M_i & \text{sinon.} \end{cases}$$

On en déduit :

$$M^{\otimes_A r} = \bigoplus_{i=1}^{n-r-1} {}_{i+r+1}M_{i+r} \otimes_{{}_{A_{i+r}}} {}_{i+r}M_{i+r-1} \otimes_{{}_{A_{i+r-1}}} \dots \otimes_{{}_{A_{i+1}}} {}_{i+1}M_i \quad \text{pour } 1 \leq r \leq n-1,$$

et $M^{\otimes_A n} = 0$, ce qui donne l'isomorphisme annoncé. $\diamond$

Dans le cas d'une algèbre triangulaire quelconque $\mathcal{T}$ de taille n , par analogie avec le cas tensoriel, on peut aussi lui associer le carquois

$$\mathcal{Q} : \quad e_1 \longrightarrow e_2 \longrightarrow \dots \longrightarrow e_n.$$

Le sommet e_i de $\mathcal{Q}$ correspond toujours à l'algèbre A_i , la flèche entre le sommet e_i et e_{i+1} correspond au bimodule ${}_{i+1}M_i$, et le chemin γ de longueur $\alpha \geq 2$ entre les sommets e_i et $e_{i+\alpha}$ correspond maintenant au bimodule $M_\gamma = {}_{i+\alpha}M_i$. Si $\tau = (\gamma_l, \dots, \gamma_1)$ est une l -trajectoire, le module correspondant est toujours $M_\tau = M_{\gamma_l} \otimes_k \dots \otimes_k M_{\gamma_1}$. Ainsi, la l^e puissance tensorielle de $\mathcal{T}$ sous R peut encore être exprimée en fonction des l -trajectoires de $\mathcal{Q}$:

$$\mathcal{T}^{\otimes_R l} = \bigoplus_{\tau \in TR_l(\mathcal{Q})} M_\tau.$$

Cette décomposition de $\mathcal{T}^{\otimes_R l}$ par les l -trajectoires de $\mathcal{Q}$ nous donne donc une paramétrisation des termes de la résolution projective de $\mathcal{T}$ donnée par la proposition 2.2, $R = \prod_i k e_i$ étant bien la sous-algèbre séparable de $\mathcal{T}$ utilisée dans la section précédente :

$$R = \begin{pmatrix} k & & \\ & \ddots & \\ & & k \end{pmatrix}.$$

4 Une suite spectrale pour la cohomologie des algèbres triangulaires

4.1 La filtration du complexe de Hochschild relatif

Considérons le complexe $\mathcal{H}$ défini dans le corollaire 2.3, dont la cohomologie est $HH^*(\mathcal{T}, X)$:

$$\mathcal{H} : \quad 0 \rightarrow X^R \longrightarrow \text{Hom}_{R-R}(T, X) \longrightarrow \dots \longrightarrow \text{Hom}_{R-R}(T^{\otimes_R l}, X) \xrightarrow{\delta_l} \dots$$

D'après la décomposition de $\mathcal{T}^{\otimes_R l}$ en fonction des l -trajectoires du carquois $\mathcal{Q}$ de $\mathcal{T}$, le l^e terme de $\mathcal{H}$ s'écrit

$$\mathcal{H}^l = \text{Hom}_{R-R} \left(\bigoplus_{\tau \in TR_l(\mathcal{Q})} M_\tau, X \right).$$

On en déduit une filtration du complexe $\mathcal{H}$ paramétrée par la longueur des trajectoires de $\mathcal{Q}$; on a précisément

$$0 = F^n \mathcal{H}^l \subset F^{n-1} \mathcal{H}^l \subset \dots \subset F^t \mathcal{H}^l \subset \dots \subset F^1 \mathcal{H}^l \subset F^0 \mathcal{H}^l = \mathcal{H}^l,$$

avec

$$F^t \mathcal{H}^l = \text{Hom}_{R-R} \left(\bigoplus_{\substack{\tau \in TR_l(\mathcal{Q}) \\ |\tau| \geq t}} M_\tau, X \right).$$

La notation suivante permet d'exprimer le module associé à une trajectoire en fonction des composantes de l'algèbre triangulaire :

Notation 4.1 Soient des entiers ordonnés $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_{t+1} \leq n$, et des entiers positifs ou nuls $p_1, \dots, p_{t+1}$. On note ${}^{p_{t+1}}_{k_{t+1}} M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_2}_{k_2} M_{k_1}^{p_1}$ le produit tensoriel sous le corps $k : A_{k_{t+1}}^{\otimes p_{t+1}} \otimes {}_{k_{t+1}} M_{k_t}^{p_t} \otimes A_{k_t}^{\otimes p_t} \otimes \dots \otimes A_{k_2}^{\otimes p_2} \otimes {}_{k_2} M_{k_1}^{p_1} \otimes A_{k_1}^{\otimes p_1}$. Pour un $\mathcal{T}$ -bimodule X , on note ${}_j X_i := e_j X e_i$, et $X_0 := \bigoplus_{1 \leq i \leq n} {}_i X_i$.

Nous allons étudier la suite spectrale associée à la filtration ci-dessus; elle converge *a priori* au niveau n vers $HH^*(\mathcal{T}, X)$. Afin de faciliter la lecture, nous allons traiter le cas $n = 3$ en détail. Dans un second temps, nous formulerons les résultats pour n quelconque.

4.2 La suite spectrale pour $n = 3$

Nous considérons donc

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ {}_2 M_1 & A_2 & \\ {}_3 M_1 & {}_3 M_2 & A_3 \end{pmatrix},$$

avec une application k -linéaire $\mu : {}_3 M_2 \otimes {}_2 M_1 \longrightarrow {}_3 M_1$ qui donne la structure multiplicative de $\mathcal{T}$. Avec la notation ci-dessus, la filtration du complexe $\mathcal{H}$ devient

$$\begin{cases} F^0 \mathcal{H}^l = \mathcal{H}^l = \text{Hom}_{R-R}(\mathcal{T}^{\otimes l}, X) \\ F^1 \mathcal{H}^l = \text{Hom}_{R-R} \left(\bigoplus_{p+q=l-1} {}^q_2 M_1^p \oplus \bigoplus_{p+q=l-1} {}^q_3 M_2^p \oplus \bigoplus_{p+q=l-1} {}^q_3 M_1^p \oplus \bigoplus_{p+q+r=l-2} {}^r_3 M_2^q {}_2 M_1^p, X \right) \\ F^2 \mathcal{H}^l = \text{Hom}_{R-R} \left(\bigoplus_{p+q+r=l-2} {}^r_3 M_2^q {}_2 M_1^p, X \right) \\ F^t \mathcal{H}^l = 0 \quad \text{si } t \geq 3. \end{cases}$$

Les termes au niveau 0 de la suite spectrale associée sont donc

$$\begin{cases} E_0^{0,l} = \text{Hom}_{R-R}(A^{\otimes l}, X), \quad \text{où } A = A_1 \times \dots \times A_n \\ E_0^{1,l} = \text{Hom}_{R-R} \left(\bigoplus_{p+q=l} {}^q_2 M_1^p \oplus \bigoplus_{p+q=l} {}^q_3 M_2^p \oplus \bigoplus_{p+q=l} {}^q_3 M_1^p, X \right) \\ E_0^{2,l} = \text{Hom}_{R-R} \left(\bigoplus_{p+q+r=l} {}^r_3 M_2^q {}_2 M_1^p, X \right). \end{cases}$$

Nous allons maintenant décrire le niveau 1 de la suite spectrale : nous allons calculer les trois termes, puis les deux différentielles. Tout d'abord, le terme $E_1^{0,*}$ est $HH^*(A, X_0) = \bigoplus_{i=1}^n HH^*(A_i, {}_i X_i)$; on a en effet $A^{\otimes l} = \bigoplus_{i=1}^n A_i^{\otimes l}$, et $\text{Hom}_{R-R}(A_i^{\otimes l}, X) \cong \text{Hom}_k(A_i^{\otimes l}, {}_i X_i)$.

Proposition 4.2 *Le terme $E_1^{1,*}$ est*

$$Ext_{A_2-A_1}^*(2M_1, 2X_1) \oplus Ext_{A_3-A_2}^*(3M_2, 3X_2) \oplus Ext_{A_3-A_1}^*(3M_1, 3X_1).$$

La démonstration de cette proposition repose sur le lemme suivant :

Lemme 4.3 [C1] *Soient B et A des k -algèbres, et N un B - A -bimodule.*

Le complexe suivant

$$\dots \rightarrow \bigoplus_{\substack{p+q=l+2 \\ p>0, q>0}} {}^q N^p \xrightarrow{d_l} \bigoplus_{\substack{p+q=l+1 \\ p>0, q>0}} {}^q N^p \rightarrow \dots \rightarrow {}^1 N^1 \xrightarrow{\epsilon} N \rightarrow 0$$

avec la différentielle

$$\begin{aligned} d_l : {}^q N^p &\longrightarrow {}^{q-1} N^p \oplus {}^q N^{p-1} \\ (b_1, \dots, b_q, x, a_1, \dots, a_p) &\longmapsto \sum_{i=1}^{p-1} (-1)^{i+1} (b_1, \dots, b_i b_{i+1}, \dots, b_q, x, a_1, \dots, a_p) \\ &\quad + (-1)^{p+1} (b_1, \dots, b_{q-1}, b_q x, a_1, \dots, a_p) \\ &\quad + (-1)^{p+2} (b_1, \dots, b_q, x a_1, a_2, \dots, a_p) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{q-1} (-1)^{p+i+2} (b_1, \dots, b_i, x, a_1, \dots, a_i a_{i+1}, \dots, a_p) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et } \epsilon : {}^1 N^1 &\longrightarrow N \\ (b, x, a) &\longmapsto bxa \end{aligned}$$

est une résolution libre de N .

PREUVE DE LA PROPOSITION 4.2. Pour obtenir la première composante de $E_1^{1,l}$, il suffit de remplacer dans le lemme 4.3 N par ${}_2 M_1$, puis d'appliquer le foncteur $Hom_{A_2-A_1}(-, {}_2 X_1)$ à la résolution libre de ${}_2 M_1$. Par adjonction, on obtient

$$Hom_{A_2-A_1} \left(\bigoplus_{\substack{p+q=l+2 \\ p>0, q>0}} {}^q {}_2 M_1^p, {}_2 X_1 \right) \cong Hom_k \left(\bigoplus_{p+q=l} {}^q {}_2 M_1^p, {}_2 X_1 \right).$$

Enfin, il reste à remarquer que l'on a aussi un isomorphisme

$$Hom_k \left(\bigoplus_{p+q=l} {}^q {}_2 M_1^p, {}_2 X_1 \right) \cong Hom_{R-R} \left(\bigoplus_{p+q=l} {}^q {}_2 M_1^p, X \right).$$

On trouve ainsi la première composante de $E_0^{0,l}$. Les deux autres composantes se traitent de la même manière. $\diamond$

Proposition 4.4 *Le terme $E_1^{2,*}$ est $\mathbf{Ext}_{A_3-A_1}^*(\mathcal{C}, {}_3 X_1)$, où $\mathcal{C}$ est un complexe de chaînes dont l'homologie est $Tor_*^{A_2}({}_3 M_2, {}_2 M_1)$.*

On peut se reporter à [W] pour la notion de foncteur $HyperExt$, $\mathbf{Ext}^*$. En particulier, $E_1^{2,*}$ est l'aboutissement d'une suite spectrale dont les termes au niveau 2 sont

$$\mathcal{E}_2^{p,q} = Ext_{A_3-A_1}^p(Tor_q^{A_2}({}_3 M_2, {}_2 M_1), {}_3 X_1) \Rightarrow \mathbf{Ext}_{A_3-A_1}^{p+q}(\mathcal{C}, {}_3 X_1).$$

PREUVE. Soit $\mathcal{C}$ le complexe

$$\dots \rightarrow {}_3M_2^q {}_2M_1 \xrightarrow{d_q} {}_3M_2^{q-1} {}_2M_1 \rightarrow \dots \rightarrow {}_3M_2^1 {}_2M_1 \rightarrow {}_3M_2 {}_2M_1 \rightarrow 0$$

de différentielle définie par

$$\begin{aligned} d_q(y, b_1, \dots, b_q, x) &= -(yb_1, b_2, \dots, b_q, x) \\ &+ \sum_{i=1}^{q-1} (-1)^{i+1} (y, b_1, \dots, b_i b_{i+1}, \dots, b_q, x) \\ &+ (-1)^{q+1} (y, b_1, \dots, b_{q-1}, b_q x). \end{aligned}$$

L'homologie de $\mathcal{C}$ est alors $H_*(\mathcal{C}) = \text{Tor}_*^{A_2}({}_3M_2, {}_2M_1)$. En effet, $\mathcal{C}$ s'identifie au complexe ${}_3M_2 \otimes_{A_2} \text{Bar}({}_2M_1)$, où $\text{Bar}({}_2M_1)$ est la résolution *Bar* de ${}_2M_1$ comme A_2 -module à gauche. On considère maintenant le complexe double $\mathcal{D}$ suivant au-dessus de $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccccccc} & & \vdots & & \vdots & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \dots & \rightarrow & \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}_r {}_3M_2^q {}_1M_1^p & \xrightarrow{d_{l,q}^h} & \dots & \rightarrow & \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}_r {}_3M_2 {}_2M_1^p \\ & & \downarrow & & & & \downarrow \\ & & \vdots & & \vdots & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \dots & \rightarrow & {}_1 {}_3M_2^q {}_2M_1^1 & \xrightarrow{d_{0,q}^h} & \dots & \rightarrow & {}_1 {}_3M_2 {}_2M_1^1 \\ & & \downarrow \epsilon_q & & & & \downarrow \epsilon_0 \\ \dots & \rightarrow & {}_3M_2^q {}_2M_1 & \xrightarrow{d_q} & \dots & \rightarrow & {}_3M_2 {}_2M_1 \\ & & \downarrow & & & & \downarrow \\ & & 0 & & & & 0 \end{array}$$

La q^e colonne de $\mathcal{D}$ est une résolution libre de ${}_3M_2^q {}_2M_1$, du même type que la résolution libre du lemme 4.3. L'expression des différentielles horizontales de $\mathcal{D}$ est semblable à celle de la différentielle de $\mathcal{C}$.

Lemme 4.5 *Le complexe double $\mathcal{D}$ est une résolution de Cartan-Eilenberg de $\mathcal{C}$ par des A_3 - A_1 -bimodules.*

Ce lemme suffit pour conclure la preuve de la proposition : il reste à appliquer à $\mathcal{D}$ le foncteur $\text{Hom}_{A_3-A_1}(-, {}_3X_1)$, et à prendre le complexe total $\text{Tot}^\oplus(\text{Hom}_{A_3-A_1}(\mathcal{D}, {}_3X_1))$, qui est isomorphe à la troisième colonne de la suite spectrale :

$$\begin{aligned} \left(\text{Tot}^\oplus(\text{Hom}_{A_3-A_1}(\mathcal{D}, {}_3X_1)) \right)^* &\cong \text{Hom}_{A_3-A_1} \left(\bigoplus_{\substack{p+q+r=*+2 \\ p>0, r>0}} {}_r {}_3M_2^q {}_2M_1^p, {}_3X_1 \right) \\ &\cong \text{Hom}_{R-R} \left(\bigoplus_{p+q+r=*} {}_r {}_3M_2^q {}_2M_1^p, X \right) = E_0^{2,*}. \end{aligned}$$

La cohomologie de ce complexe est alors $\mathbf{Ext}_{A_3-A_1}^*(\mathcal{C}, {}_3X_1)$.

PREUVE DU LEMME 4.5. Il y a deux points à vérifier :

1. Pour tout $q \geq 0$, les bords $B_{*,q}^h(\mathcal{D})$ de la différentielle horizontale de $\mathcal{D}$ forment une résolution projective de $B_q(\mathcal{C})$, le q^e bord de $\mathcal{C}$.
2. Pour tout $q \geq 0$, les groupes d'homologie $H_{*,q}^h(\mathcal{D})$ par rapport à la différentielle horizontale de $\mathcal{D}$ forment une résolution projective de $H_q(\mathcal{C})$.

Pour montrer ces deux propriétés, il suffit de remarquer que la différentielle horizontale

$$d_{l,q}^h : \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}^r_3M_2^q {}_2M_1^p \longrightarrow \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}^r_3M_2^{q-1} {}_2M_1^p$$

s'identifie à

$$\bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} (-1)^{r+1} 1_{A_3} \otimes \dots \otimes 1_{A_3} \otimes d_q \otimes 1_{A_1} \otimes \dots \otimes 1_{A_1},$$

où d_q est la q^e différentielle de $\mathcal{C}$. On a donc les identifications

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_{l,q}^h(\mathcal{D}) = \text{Ker } d_{l,q}^h \cong \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}^r(\text{Ker } d_q)^p = \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}^r(Z_q(\mathcal{C}))^p \\ B_{l,q}^h(\mathcal{D}) = \text{Im } d_{l,q+1}^h \cong \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}^r(\text{Im } d_{q+1})^p = \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}^r(B_q(\mathcal{C}))^p \end{array} \right.$$

Ainsi, $B_{*,q}^h(\mathcal{D}) \twoheadrightarrow B_q(\mathcal{C})$ est de la même forme que le complexe donné au lemme 4.3 ; c'est donc une résolution libre de $B_q(\mathcal{C})$. On a de plus :

$$H_{l,q}^h(\mathcal{D}) \cong \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} \frac{{}^r(Z_q(\mathcal{C}))^p}{{}^r(B_q(\mathcal{C}))^p} \cong \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}^r\left(\frac{Z_q(\mathcal{C})}{B_q(\mathcal{C})}\right)^p = \bigoplus_{\substack{p+r=l+2 \\ p>0, r>0}} {}^r(H_q(\mathcal{C}))^p,$$

donc $H_{*,q}^h(\mathcal{D}) \twoheadrightarrow H_q(\mathcal{C})$ est encore une résolution libre. $\diamond$

Nous avons donc complètement explicité les termes du niveau 1 de la suite spectrale ; la ligne l est

$$\begin{array}{ccc} HH^l(A_1, {}_1X_1) & & Ext_{A_2-A_1}^l(2M_1, {}_2X_1) \\ \oplus HH^l(A_2, {}_2X_2) & \xrightarrow{d_1^{0,l}} & \oplus Ext_{A_3-A_2}^l(3M_2, {}_3X_2) \\ \oplus HH^l(A_3, {}_3X_3) & & \oplus Ext_{A_3-A_1}^l(3M_1, {}_3X_1) \end{array} \xrightarrow{d_1^{1,l}} \mathbf{Ext}_{A_3-A_1}^l(\mathcal{C}, {}_3X_1).$$

Il nous reste maintenant à expliciter les deux différentielles. Pour cela, rappelons tout d'abord que pour $f \in Hom_k(A_1^{\otimes k l}, {}_1X_1)$ et $\theta \in End_{A_2-A_1}(2M_1)$, on définit l'élément $\theta \smile f$ de $Hom_k(2M_1 A_1^{\otimes k l}, {}_2X_1)$ de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \theta \smile f : {}_2M_1 A_1^{\otimes k l} &\longrightarrow {}_2X_1 \\ (x, a_1, \dots, a_l) &\longmapsto \theta(x) f(a_1, \dots, a_l), \end{aligned}$$

le produit ${}_2M_1 \otimes {}_1X_1 \longrightarrow {}_2X_1$ étant induit par la structure de $\mathcal{T}$ -module à gauche de X $\mathcal{T} \otimes X \longrightarrow X$. Le produit *cup* ainsi défini induit un produit en cohomologie :

$$End_{A_2-A_1}(2M_1) \otimes HH^l(A_1, {}_1X_1) \longrightarrow Ext_{A_2-A_1}^*(2M_1, {}_2X_1);$$

En effet, on vérifie facilement que $\delta(\theta \smile f) = -\theta \smile \delta f$. De la même façon, pour $\theta \in \text{End}_{A_3-A_2}({}_3M_2)$ et $f \in \text{Hom}_{A_2-A_1}({}_2M_1 A_1^{\otimes k l-1}, {}_2X_1)$, on peut construire un élément $\theta \smile f$ de $\text{Hom}_{A_3-A_1}({}_3M_2 {}_2M_1 A_1^{\otimes k l-1}, {}_3X_1)$ de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \theta \smile f : {}_3M_2 {}_2M_1^{l-1} &\longrightarrow {}_3X_1 \\ (y, x, a_1, \dots, a_{l-1}) &\longmapsto \theta(y)f(x, a_1, \dots, a_{l-1}); \end{aligned}$$

cette construction induit aussi un produit *cup* en cohomologie :

$$\text{End}_{A_3-A_2}({}_3M_2) \otimes \text{Ext}_{A_2-A_1}^l({}_2M_1, {}_2X_1) \longrightarrow \mathbf{Ext}_{A_3-A_1}^l(\mathcal{C}, {}_3X_1).$$

Proposition 4.6 *La première différentielle du niveau 1*

$$\begin{aligned} d_1^{0,l} : HH^l(A_1, {}_1X_1) \oplus HH^l(A_2, {}_2X_2) \oplus HH^l(A_3, {}_3X_3) \\ \longrightarrow \text{Ext}_{A_2-A_1}^l({}_2M_1, {}_2X_1) \oplus \text{Ext}_{A_3-A_2}^l({}_3M_2, {}_3X_2) \oplus \text{Ext}_{A_3-A_1}^l({}_3M_1, {}_3X_1) \end{aligned}$$

est donnée par la somme de produits *cup* :

$$\begin{aligned} f + g + h &\longmapsto {}_1M_1 \smile f + (-1)^{l+1} g \smile {}_1M_1 \\ &\quad + {}_3M_2 \smile g + (-1)^{l+1} h \smile {}_3M_2 \\ &\quad + {}_3M_1 \smile f + (-1)^{l+1} h \smile {}_3M_1, \end{aligned}$$

où 1_N désigne le morphisme identité du module N . La seconde différentielle

$$d_1^{1,l} : \text{Ext}_{A_2-A_1}^l({}_2M_1, {}_2X_1) \oplus \text{Ext}_{A_3-A_2}^l({}_3M_2, {}_3X_2) \oplus \text{Ext}_{A_3-A_1}^l({}_3M_1, {}_3X_1) \longrightarrow \mathbf{Ext}_{A_3-A_1}^l(\mathcal{C}, {}_3X_1)$$

est donnée par

$$f + g + h \longmapsto {}_3M_2 \smile f + (-1)^{l+2} g \smile {}_1M_1 + \delta h,$$

où δh est définie pour $h : {}^q_3M_1^p \longrightarrow {}_3X_1$ par $\delta h = (-1)^{q+1} h \circ (1_{A_3}^{\otimes kq} \otimes \mu \otimes 1_{A_1}^{\otimes kp}) : {}^q_3M_2 {}_2M_1^p \longrightarrow {}_3X_1$.

Les résultats de cette proposition découlent de calculs directs. Nous terminons l'étude du cas $n = 3$ en donnant dans le cas des algèbres triangulaires *tensorielles* une condition pour que la suite spectrale dégénère au niveau 2 :

Proposition 4.7 *La suite spectrale de cohomologie associée à l'algèbre triangulaire tensorielle*

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ {}_2M_1 & k & & \\ {}_3M_2 \otimes {}_2M_1 & {}_3M_2 & A_3 & \end{pmatrix}$$

dégénère au niveau 2.

La démonstration de cette proposition repose sur le lemme suivant :

Lemme 4.8 *Pour une algèbre triangulaire tensorielle de taille 3*

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ {}_2M_1 & A_2 & & \\ {}_3M_2 \otimes_{A_2} {}_2M_1 & {}_3M_2 & A_3 & \end{pmatrix}$$

la différentielle au niveau 2 de la suite spectrale de cohomologie associée

$$d_2^{0,l} : E_2^{0,l} = \text{Ker } d_1^{0,l} \longrightarrow \frac{E_1^{2,l-1}}{\text{Im } d_1^{1,l}} = E_2^{2,l-1}$$

est nulle sur les composantes de $E_2^{0,l}$ dépendant de A_1 et A_3 :

$$d_2^{0,l} \left((HH^l(A_{1,1}X_1) \oplus HH^l(A_{3,3}X_3)) \cap \text{Ker } d_1^{0,l} \right) = 0.$$

En effet, dans ce cas, la proposition 4.7 en découle : comme $HH^*(k, {}_2X_2) = 0$ si $* > 0$, le terme $E_2^{0,*}$ pour $* > 0$ est exactement $(HH^*(A_{1,1}X_1) \oplus HH^*(A_{3,3}X_3)) \cap \text{Ker } d_1^{0,*}$; d'après le lemme la différentielle $d_2^{0,*}$ est donc nulle.

PREUVE DU LEMME 4.8. Soit $f \in \text{Hom}_k(A_1^{\otimes l}, {}_1X_1)$ et $h \in \text{Hom}_k(A_3^{\otimes l}, {}_3X_3)$ des cocycles. La différentielle horizontale appliquée à $f + h$ a quatre composantes :

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1_{2M_1} \smile f & \in \text{Hom}_k({}_2M_1 A_1^{\otimes l}, {}_2X_1) \\ h \smile 1_{3M_2} & \in \text{Hom}_k(A_3^{\otimes l} {}_2M_1, {}_3X_2) \\ 1_{3M_2 \otimes_{A_2} {}_2M_1} \smile f & \in \text{Hom}_k({}_3M_2 \otimes_{A_2} {}_2M_1 A_1^{\otimes l}, {}_3X_1) \\ h \smile 1_{3M_2 \otimes_{A_2} {}_2M_1} & \in \text{Hom}_k(A_3^{\otimes l} {}_3M_2 \otimes_{A_2} {}_2M_1, {}_3X_1). \end{array} \right.$$

Si $f + h$ est dans $\text{Ker } d_1^{0,l}$, alors ces quatre éléments sont des cobords par rapport à la différentielle verticale, c'est-à-dire qu'il existe

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi \in \text{Hom}_k({}_2M_1 A_1^{\otimes l-1}, {}_2X_1) \\ \psi \in \text{Hom}_k(A_3^{\otimes l-1} {}_3M_2, {}_3X_2) \\ \chi \in \text{Hom}_k({}_3M_2 \otimes_{A_2} {}_2M_1 A_1^{\otimes l-1}, {}_3X_1) \\ \xi \in \text{Hom}_k(A_3^{\otimes l-1} {}_3M_2 \otimes_{A_2} {}_2M_1, {}_3X_1), \end{array} \right.$$

tels que, pour $x \in {}_2M_1$, $y \in {}_3M_2$, $a_1, \dots, a_l \in A_1$ et $c_1, \dots, c_l \in A_3$, les égalités suivantes soient vérifiées :

$$\begin{aligned} \phi(xa_1, \dots, a_l) + \sum_{i=1}^{l-1} (-1)^i \phi(x, \dots, a_i a_{i+1}, \dots) + (-1)^l \phi(x, \dots, a_{l-1}) a_l &= x f(a_1, \dots, a_l) \\ c_1 \psi(c_2, \dots, c_l, y) + \sum_{i=1}^{l-1} (-1)^i \psi(\dots, c_i c_{i+1}, \dots, y) + (-1)^l \psi(c_1, \dots, c_l) y &= h(c_1, \dots, c_l) y \\ \chi(y \otimes x a_1, \dots, a_l) + \sum_{i=1}^{l-1} (-1)^i \chi(y \otimes x, \dots, a_i a_{i+1}, \dots) + (-1)^l \chi(y \otimes x, a_1, \dots, a_l) &= y \otimes x f(a_1, \dots, a_l) \\ c_1 \xi(c_2, \dots, c_l, y \otimes x) + \sum_{i=1}^{l-1} (-1)^i \xi(\dots, c_i c_{i+1}, \dots, y \otimes x) + (-1)^l \xi(c_1, \dots, c_l) y \otimes x &= h(c_1, \dots, c_l) y \otimes x. \end{aligned}$$

Pour obtenir un représentant de $d_2^{0,l}(f + h)$, il reste à appliquer à ϕ , ψ , χ et ξ la deuxième différentielle horizontale ; on obtient ainsi que

$$d_2^{0,l}(f + h) : {}_3M_2 {}_2M_1 A_1^{l-1} \oplus A_3^{l-1} {}_3M_2 {}_2M_1 \longrightarrow {}_3X_1$$

est donné par :

$$\begin{aligned} d_2^{0,l}(f + h)((y, x, a_1, \dots, a_{l-1}) + (c_1, \dots, c_{l-1}, y', x')) \\ = y \phi(x, a_1, \dots, a_{l-1}) - \chi(y \otimes x, a_1, \dots, a_{l-1}) + (-1)^l (\psi(c_1, \dots, c_{l-1}, y') x' - \xi(c_1, \dots, c_{l-1}, y' \otimes x')). \end{aligned}$$

Or $d_2^{0,l}(f+h)$ ne dépend pas du choix des quatre éléments ϕ, ψ, χ et ξ . Remarquons alors que l'on peut définir χ et ξ en fonction respectivement de ϕ et de ψ , de façon à ce qu'ils vérifient les égalités demandées, en posant :

$$\begin{cases} \chi(y \otimes x, a_1, \dots, a_{l-1}) &= y\phi(x, a_1, \dots, a_{l-1}) \\ \xi(c_1, \dots, c_{l-1}, y \otimes x) &= \psi(c_1, \dots, c_{l-1}, y)x. \end{cases}$$

Les morphismes χ et ξ sont bien définis, car ϕ et ψ sont A_2 -linéaires, respectivement à gauche et à droite. En effet, la différentielle verticale appliquée à ϕ a deux composantes : l'une dans $Hom_k({}_2M_1A_1^{\otimes l}, {}_2X_1)$, qui est par hypothèse $1_{{}_2M_1} \sim f$, et l'autre dans $Hom_k(A_2{}_2M_1A_1^{\otimes l-1}, {}_2X_1)$, qui doit être nulle. Cela signifie explicitement que l'application

$$\begin{aligned} A_2{}_2M_1A_1^{l-1} &\longrightarrow {}_2X_1 \\ (b, x, a_1, \dots, a_{l-1}) &\longmapsto b\phi(x, a_1, \dots, a_{l-1}) - \phi(bx, a_1, \dots, a_{l-1}) \end{aligned}$$

est nulle ; ainsi ϕ est bien A_2 -linéaire à gauche. On montre de la même façon que ψ est A_2 -linéaire à droite. En écrivant alors χ et ξ sous la forme ci-dessus dans l'expression de $d_2^{0,l}(f+h)$, on obtient $d_2^{0,l}(f+h) = 0$. $\diamond$

4.3 La suite spectrale pour n quelconque

Nous allons terminer cette section en donnant des résultats pour $n \geq 3$. Sous des hypothèses de projectivité sur certains modules, les termes du niveau 1 de la suite spectrale seront des sommes de groupes d'extension. Dans le cas général, il suffirait de remplacer dans les calculs les foncteurs Ext par des foncteurs $HyperExt$ emboîtés. Par ailleurs, les différentielles au niveau 1 s'expriment encore à l'aide de produits cup .

Rappelons que les termes au niveau 0 de la suite spectrale sont

$$E_0^{t,l-t} = Hom_{R-R} \left(\bigoplus_{\substack{\tau \in TR_l(\mathcal{Q}) \\ |\tau|=t}} M_\tau, X \right),$$

où le module M_τ , associé à la l -trajectoire τ de longueur t , est de la forme

$$M_\tau = {}^{p_{t+1}}_{k_{t+1}} M_{k_t} {}^{p_t}_{k_t} \dots {}^{p_2}_{k_2} M_{k_1} {}^{p_1}_{k_1}, \text{ avec } p_1 + \dots + p_{t+1} = l - t.$$

Supposons alors que pour tout i variant de 2 à t , pour tous entiers $p_{i+1}, \dots, p_t$, les $A_{k_i}^e$ -modules

$${}_{k_{t+1}} M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_{i+1}}_{k_{i+1}} M_{k_i} {}_{k_i} M_{k_{i-1}} \otimes_{A_{k_{i-1}}} \dots \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2} M_{k_1}$$

sont projectifs.

Proposition 4.9 *Sous l'hypothèse de projectivité ci-dessus, le niveau 1 de la suite spectrale est donné par*

$$\begin{cases} E_1^{0,*} &= HH^*(A, X_0) \\ E_1^{1,*} &= \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq n-1 \\ 1 \leq \alpha \leq n-i}} Ext_{A_{i+\alpha}-A_i}^* ({}_{i+\alpha} M_i, {}_{i+\alpha} X_i) \\ E_1^{t,*} &= \bigoplus_{1 \leq k_1 < \dots < k_{t+1} \leq n} Ext_{A_{k_{t+1}}-A_{k_1}}^* ({}_{k_{t+1}} M_{k_t} \otimes_{A_{k_t}} \dots \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2} M_{k_1}, {}_{k_{t+1}} X_{k_1}), \quad t \geq 2. \end{cases}$$

Le calcul des termes $E_1^{0,*}$ et $E_1^{1,*}$ est le même que dans le cas $n = 3$ et ne demande pas d'hypothèses supplémentaires. En revanche, nous allons utiliser le lemme suivant pour le calcul de $E_1^{t,*}$ pour $t \geq 2$:

Lemme 4.10 *Soient A une k -algèbre, N et N' des A -modules respectivement à droite et à gauche. Si $N \otimes_k N'$ est projectif comme A^e -module, alors le complexe suivant :*

$$\mathcal{R} : \quad \dots \rightarrow N^{l+1}N' \xrightarrow{d_l} N^l N' \rightarrow \dots \rightarrow N^1 N' \rightarrow N N' \rightarrow 0$$

de différentielle

$$\begin{aligned} d_l : \quad N^{l+1}N' &\longrightarrow N^l N' \\ (x, a_1, \dots, a_l, x') &\longmapsto (xa_1, a_2, \dots, a_l, x') \\ &\quad + \sum_{i=1}^{l-1} (-1)^i (x, a_1, \dots, a_i a_{i+1}, \dots, a_l, x') \\ &\quad + (-1)^l (x, a_1, \dots, a_{l-1}, a_l x') \end{aligned}$$

est acyclique en degré ≥ 0 , et son homologie en degré -1 est $N \otimes_A N'$.

PREUVE. Il suffit de remarquer que $\mathcal{R}$ s'identifie au complexe $(N \otimes_k N') \otimes_{A^e} \text{Bar}(A)$, de différentielle $d_* = -1_{N \otimes_k N'} \otimes \partial_{*+1}$, où (Bar, ∂) est la résolution Bar de A . Le A^e -module $N \otimes_k N'$ étant supposé projectif, le foncteur $(N \otimes_k N') \otimes_{A^e} -$ est exact. Comme $H_l(\text{Bar}_*(A)) = 0$ pour $l > 0$ et $H_0(\text{Bar}_*(A)) = A$, on obtient :

$$\begin{cases} H_l(\mathcal{R}) = 0 & \text{pour } l \geq 0, \\ H_{-1}(\mathcal{R}) = N \otimes_k N' \otimes_{A^e} A \cong N \otimes_A A \otimes_A N' \cong N \otimes_A N'. \end{cases} \diamond$$

PREUVE DE LA PROPOSITION 4.9. Soit une suite d'entiers fixée $1 \leq k_1 < \dots < k_{t+1} \leq n$. On reprend le complexe du lemme 4.3, en remplaçant N par ${}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_3}_{k_3}M_{k_2}^{p_2}M_{k_1}$:

$$\dots \rightarrow \bigoplus_{\substack{p_{t+1}+p_1=l+2 \\ p_{t+1}>0, p_1>0}} {}^{p_{t+1}}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_2}_{k_2}M_{k_1}^{p_1} \rightarrow \dots \rightarrow {}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_2}_{k_2}M_{k_1} \rightarrow 0.$$

C'est une résolution libre de ${}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_3}_{k_3}M_{k_2}^{p_2}M_{k_1}$. On fait maintenant varier p_2 dans le complexe double suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} & & \vdots & & \vdots & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \dots \rightarrow & \bigoplus_{\substack{p_{t+1}+p_1=l+2 \\ p_{t+1}>0, p_1>0}} & {}^{p_{t+1}}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_2}_{k_2}M_{k_1}^{p_1} & \rightarrow \dots \rightarrow & {}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_2}_{k_2}M_{k_1} & \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \vdots & & \vdots & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \dots \rightarrow & \bigoplus_{\substack{p_{t+1}+p_1=l+2 \\ p_{t+1}>0, p_1>0}} & {}^{p_{t+1}}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^1_{k_2}M_{k_1}^{p_1} & \rightarrow \dots \rightarrow & {}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^1_{k_2}M_{k_1} & \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \dots \rightarrow & \bigoplus_{\substack{p_{t+1}+p_1=l+2 \\ p_{t+1}>0, p_1>0}} & {}^{p_{t+1}}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}_{k_2}M_{k_1}^{p_1} & \rightarrow \dots \rightarrow & {}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}_{k_2}M_{k_1} & \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 0 & & 0 & & \end{array}$$

Les lignes de ce complexe double sont des résolutions libres du type de celle donnée au lemme 4.3. En particulier, les lignes sont acycliques, donc le complexe total $\mathcal{B}_2$ l'est aussi. On considère alors le sous-complexe $\mathcal{S}_2$ formé par la dernière colonne. On lui applique le lemme 4.10 en supposant ${}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_3}{}_{k_3}M_{k_2} {}_{k_2}M_{k_1}$ projectif comme $A_{k_2}^e$ -module. Ainsi l'homologie de $\mathcal{S}_2$ est nulle en degré ≥ 0 , et vaut ${}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_3}{}_{k_3}M_{k_2} \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2}M_{k_1}$ en degré -1 . De la suite exacte longue d'homologie associée à la suite exacte courte de complexes $0 \rightarrow \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{B}_2 \rightarrow \mathcal{B}_2/\mathcal{S}_2 \rightarrow 0$, on tire :

$$\begin{cases} H_l(\mathcal{B}_2/\mathcal{S}_2) = 0 & \text{pour } l \geq 0, \\ H_{-1}(\mathcal{B}_2/\mathcal{S}_2) = {}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_3}{}_{k_3}M_{k_2} \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2}M_{k_1}. \end{cases}$$

On augmente alors $\mathcal{B}_2/\mathcal{S}_2$ par ${}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_3}{}_{k_3}M_{k_2} \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2}M_{k_1}$, et on décale les indices d'un cran. On a donc obtenu une résolution libre de ${}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_3}{}_{k_3}M_{k_2} \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2}M_{k_1}$:

$$\dots \rightarrow \bigoplus_{\substack{p_{t+1}+p_2+p_1=l+2 \\ p_{t+1}>0, p_1>0}} {}^{p_{t+1}}{}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_2}{}_{k_2}M_{k_1} {}^{p_1} \rightarrow \dots \rightarrow {}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_3}{}_{k_3}M_{k_2} \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2}M_{k_1} \rightarrow 0.$$

On itère alors ce procédé, en faisant varier successivement p_i ($2 \leq i \leq t$) dans un complexe double $\mathcal{B}_i$, en supposant que ${}_{k_{t+1}}M_{k_t}^{p_t} \dots {}^{p_{i+1}}{}_{k_{i+1}}M_{k_i} {}_{k_i}M_{k_{i-1}} \otimes_{A_{k_{i-1}}} \dots \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2}M_{k_1}$ est projectif comme $A_{k_i}^e$ -module. On obtient finalement une résolution libre de ${}_{k_{t+1}}M_{k_t} \otimes_{A_{k_t}} \dots \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2}M_{k_1}$ comme $A_{k_{t+1}}-A_{k_1}$ -bimodule :

$$\dots \rightarrow \bigoplus_{\substack{p_{t+1}+\dots+p_1=l+2 \\ p_{t+1}>0, p_1>0}} {}^{p_{t+1}}{}_{k_{t+1}}M_{k_t} {}^{p_t} \dots {}^{p_2}{}_{k_2}M_{k_1} {}^{p_1} \rightarrow \dots \rightarrow {}_{k_{t+1}}M_{k_t} \otimes_{A_{k_t}} \dots \otimes_{A_{k_2}} {}_{k_2}M_{k_1} \rightarrow 0.$$

Pour finir, on applique à cette résolution le foncteur $Hom_{A_{k_{t+1}}-A_{k_1}}(-, {}_{k_{t+1}}X_{k_1})$ et on simplifie en utilisant la formule d'adjonction habituelle. On retrouve ainsi une des composantes du terme $E_0^{t,l}$ de la suite spectrale, dont la cohomologie est donc

$$Ext_{A_{k_{t+1}}-A_{k_1}}^* \left({}_{k_{t+1}}M_{k_t} \dots {}_{k_2}M_{k_1}, {}_{k_{t+1}}X_{k_1} \right). \diamond$$

Pour terminer, nous explicitons les différentielles au niveau 1 de la suite spectrale.

Proposition 4.11 *La première différentielle au niveau 1 est :*

$$\begin{aligned} d_1^{0,l} : \bigoplus_{1 \leq j \leq n} HH^l(A_j, {}_jX_j) &\rightarrow \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq n-1 \\ 1 \leq \alpha \leq n-i}} Ext_{A_{i+\alpha}-A_i}^l ({}_{i+\alpha}M_i, {}_{i+\alpha}X_i) \\ f_1 + \dots + f_n &\mapsto \sum_{j=1}^n \left\{ \sum_{\beta=1}^{n-j} 1_{j+\beta}M_j \smile f_j + (-1)^{l+1} \sum_{\beta=1}^{j-1} f_j \smile 1_jM_{j-\beta} \right\} \end{aligned}$$

Nous allons maintenant donner une expression des différentielles $d_1^{t,l}$ pour $t > 0$; pour cela, rappelons que l'on note pour $1 \leq i < j < l \leq n$

$$\mu_{l,j,i} : {}_lM_j \otimes {}_jM_i \longrightarrow {}_lM_i$$

les morphismes qui permettent de définir le produit de $\mathcal{T}$.

Proposition 4.12 *Soit*

$$f : {}^{p_{t+1}}{}_{k_{t+1}}M_{k_t} {}^{p_t} \dots {}^{p_2}{}_{k_2}M_{k_1} {}^{p_1} \longrightarrow {}_{k_{t+1}}X_{k_1}, \quad \text{avec } p_1 + \dots + p_{t+1} = l - t,$$

un représentant d'un élément de la composante $\text{Ext}_{A_{k_{t+1}} - A_{k_t}}^l ({}_{k_{t+1}}M_{k_t} \otimes_{A_{k_t}} \dots \otimes_{A_{k_2}} M_{k_1}, {}_{i+\alpha}X_i)$ de $E_1^{t,l}$. La différentielle $d_1^{t,l}$, restreinte à cette composante, est alors donnée par :

$$\begin{aligned} d_1^{t,l} f &= \sum_{k_{t+2}=k_{t+1}+1}^n {}_{k_{t+2}}M_{k_{t+1}} \smile f + \sum_{k_0=1}^{k_1-1} (-1)^{l+2} f \smile {}_{k_1}M_{k_0} \\ &+ \sum_{i=1}^t \sum_{\alpha=k_i+1}^{k_{i+1}-1} (-1)^{p_{t+1}+\dots+p_{i+1}+t-i+1} f \circ (1^{\otimes p_{t+1}+\dots+p_{i+1}+t-i} \otimes \mu_{k_{i+1},\alpha,k_i} \otimes 1^{\otimes p_i+\dots+p_1+i-1}). \end{aligned}$$

5 Applications

5.1 Algèbre des chemins d'un carquois sans cycles orientés

Nous considérons dans cette section l'algèbre sur un corps k associée à un carquois sans cycles orientés. Nous montrons qu'elle est triangulaire, et que sa cohomologie peut être calculée en utilisant la suite spectrale construite à la section 4.

Définition 5.1 Soit $\mathcal{Q}$ un carquois, et k un corps. L'algèbre des chemins de $\mathcal{Q}$ sur k , notée $k\mathcal{Q}$, est la k -algèbre de base l'ensemble des chemins de $\mathcal{Q}$, et dont le produit est donné sur la base par la composition des chemins quand elle est possible, et par 0 sinon.

Nous allons considérer dans la suite deux types de carquois : les *carquois sans cycles orientés* et les *carquois à niveaux*. Un cycle orienté dans un carquois est un chemin dont le but coïncide avec la source. Un carquois sera dit à n niveaux si on peut indexer ses sommets par $e_1^1, \dots, e_1^{i_1}, \dots, e_n^1, \dots, e_n^{i_n}$, de façon à ce qu'il n'existe pas de flèche entre les sommets e_r^i et e_s^j si $r > s$.

Proposition 5.2 Soit $\mathcal{Q}$ un carquois connexe sans cycles orientés. Alors l'algèbre des chemins de $\mathcal{Q}$ est isomorphe à une algèbre triangulaire.

Cette proposition est une conséquence immédiate des deux lemmes suivants :

Lemme 5.3 Si $\mathcal{Q}$ est un carquois connexe sans cycles orientés, alors on peut ordonner les sommets de $\mathcal{Q}$ de façon à obtenir un carquois à niveaux.

Lemme 5.4 Si $\mathcal{Q}$ est un carquois à niveaux, alors l'algèbre $k\mathcal{Q}$ est triangulaire.

PREUVE DU LEMME 5.3 Rappelons tout d'abord qu'un carquois est un graphe orienté fini ; soit N le nombre de sommets du carquois sans cycles orientés $\mathcal{Q}$. Nous allons montrer que l'on peut munir $\mathcal{Q}$ d'une structure à N niveaux ; cette construction n'est pas canonique, et, dans la pratique, le nombre de niveaux de $\mathcal{Q}$ pourra être inférieur. Remarquons qu'il existe (au moins) un sommet de $\mathcal{Q}$ qui n'est le but d'aucune flèche ; nous dirons qu'un tel sommet est *initial*. Une construction des niveaux de $\mathcal{Q}$ se fait par induction sur les sommets initiaux. Soit e un sommet initial ; on définit le niveau 1 de $\mathcal{Q}$ comme le niveau de e . On considère alors le carquois dont l'ensemble des sommets est $\mathcal{Q} \setminus \{e\}$. Ce carquois n'a pas de cycles orientés, il possède donc un sommet initial e' . On définit le niveau 2 de $\mathcal{Q}$ comme le niveau de e' . On itère ce procédé jusqu'au N^e sommet de $\mathcal{Q}$, qui formera le niveau N . $\diamond$

PREUVE DU LEMME 5.4 Si $\mathcal{Q}$ a n niveaux, on note pour tout $r \in \{1, \dots, n\}$ $e_r^1, \dots, e_r^{i_r}$ les sommets formant le niveau r de $\mathcal{Q}$, et on considère la k -algèbre A_r dont la base comme k -espace vectoriel est $\{e_r^1, \dots, e_r^{i_r}\}$. De plus, pour $r \in \{1, \dots, n-1\}$, et $s \in \{r+1, \dots, n\}$,

on considère ${}_sM_r$ le k -espace vectoriel dont la base est l'ensemble des chemins de tous les e_r^i vers les e_s^j . Alors l'algèbre $k\mathcal{Q}$ est l'algèbre triangulaire

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ {}_2M_1 & A_2 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ {}_nM_1 & \cdots & {}_nM_{n-1} & A_n \end{pmatrix},$$

les applications $\mu : {}_tM_s \otimes_k {}_sM_r \rightarrow {}_tM_r$ étant induites par la composition des chemins de $\mathcal{Q}$ quand elle est possible. $\diamond$

Nous allons maintenant expliciter le calcul de la suite spectrale sur un exemple de carquois sans cycles orientés :

$$\mathcal{Q} : \quad a \xrightarrow{\quad} b \quad \begin{array}{c} \uparrow \uparrow \\ \downarrow \downarrow \\ c \\ d \end{array}$$

L'algèbre $k\mathcal{Q}$ des chemins de $\mathcal{Q}$ est triangulaire tensorielle de taille 3 :

$$k\mathcal{Q} = \begin{pmatrix} k & & \\ k & k & \\ k^4 & k^4 & k^2 \end{pmatrix}.$$

La cohomologie de Hochschild de $k\mathcal{Q}$ à valeurs dans $k\mathcal{Q}$ peut être calculée à l'aide de la suite spectrale construite à la section 4. Soit $\mathcal{H}$ le complexe de Hochschild relatif de $k\mathcal{Q}$ par rapport à la sous-algèbre séparable

$$R = \begin{pmatrix} k & & \\ & k & \\ & & k^2 \end{pmatrix},$$

dont le terme de degré l est $\mathcal{H}^l = Hom_{R-R}((k\mathcal{Q})^{\otimes_{R^l}}, k\mathcal{Q})$, et dont la cohomologie est $HH^*(k\mathcal{Q})$. La suite spectrale associée à la filtration de $\mathcal{H}$ par la longueur des trajectoires de $\mathcal{Q}$ n'a au niveau 1 qu'une seule ligne non nulle :

$$R = k^4 \xrightarrow{d^0} k \oplus End_{k^2-k}(k^4) \oplus End_{k^2-k}(k^4) \xrightarrow{d^1} End_{k^2-k}(k^4).$$

En effet, les groupes d'extension de puissances de k sont nuls en degré positifs. Les deux différentielles sont :

$$\begin{aligned} d^0 : \quad k^4 &\longrightarrow k \oplus End_{k^2-k}(k^4) \oplus End_{k^2-k}(k^4) \\ (\alpha, \beta, \gamma, \delta) &\longmapsto ((\alpha - \beta)id_{k^4}, \phi, \psi) \end{aligned}$$

où ϕ et ψ sont les applications :

$$\phi = \begin{pmatrix} (\beta - \gamma)id_{k^2} & 0 \\ 0 & (\beta - \delta)id_{k^2} \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} (\alpha - \gamma)id_{k^2} & 0 \\ 0 & (\alpha - \delta)id_{k^2} \end{pmatrix},$$

et

$$\begin{aligned} d^1 : \quad k \oplus \text{End}_{k^2-k}(k^4) \oplus \text{End}_{k^2-k}(k^4) &\longrightarrow \text{End}_{k^2-k}(k^4) \\ (\lambda, \phi, \psi) &\longmapsto \lambda \text{id}_{k^4} + \phi - \psi. \end{aligned}$$

On a ainsi :

$$\begin{cases} \text{Ker } d^0 \cong k, & \text{Ker } d^1 = k \oplus \text{End}_{k^2-k}(k^4), \\ \text{Im } d^0 \cong k^3, & \text{Im } d^1 = \text{End}_{k^2-k}(k^4). \end{cases}$$

D'où les termes de niveau 2 de la suite spectrale, et donc les groupes $HH^*(k\mathcal{Q})$:

$$HH^0(k\mathcal{Q}) \cong k, \quad HH^1(k\mathcal{Q}) \cong k^6, \quad HH^*(k\mathcal{Q}) = 0 \text{ pour } * \geq 2.$$

5.2 Liens avec des résultats antérieurs

La suite spectrale construite à la section 4, et l'application aux carquois sans cycles orientés, généralisent un résultat de Cibils sur l'algèbre d'incidence d'un complexe simplicial. Soit Σ un complexe simplicial de dimension finie. On associe à Σ un carquois $\mathcal{Q}_\Sigma$: les sommets sont les simplexes de Σ , et il existe une flèche entre le sommet σ et le sommet τ si et seulement si $\dim \tau = \dim \sigma + 1$ et le simplexe σ est contenu dans le simplexe τ . Ce carquois a des niveaux naturels donnés par la dimension des simplexes de Σ , ainsi l'algèbre $k\mathcal{Q}_\Sigma$ est triangulaire. Soit I l'idéal de $k\mathcal{Q}_\Sigma$ engendré par les différences $\gamma - \gamma'$, où γ et γ' sont des chemins de mêmes extrémités (de tels chemins sont dits *parallèles*). L'algèbre $k\mathcal{Q}_\Sigma/I$ est alors l'algèbre d'incidence du poset associé à Σ sur k ; elle est encore triangulaire. D'après Gerstenhaber et Schack [GS3], la cohomologie de Hochschild de l'algèbre $k\mathcal{Q}_\Sigma/I$ à valeurs dans elle-même est isomorphe à la cohomologie simpliciale de Σ à coefficients dans k . Utilisant cet isomorphisme, Cibils a construit dans [C2] une suite spectrale de cohomologie convergeant vers $H^*(\Sigma, k)$, dont le niveau 1 est concentré sur la première ligne. Ce résultat peut aussi se déduire de la suite spectrale construite à la section 4; en effet, comme dans l'exemple précédent, la nullité des groupes d'extension supérieurs de puissances de k implique que seule la première ligne du niveau 1 de la suite spectrale est non nulle.

Par ailleurs, si $\mathcal{C}$ est une catégorie finie, on peut lui associer la k -algèbre $k\mathcal{C}$ des morphismes de $\mathcal{C}$: sa base comme k -espace vectoriel est l'ensemble des morphismes de $\mathcal{C}$, et son produit est induit par la composition des morphismes. Par exemple, si l'on considère la catégorie $\mathcal{C}_\mathcal{Q}$ induite par un carquois $\mathcal{Q}$, les objets de $\mathcal{C}_\mathcal{Q}$ étant les sommets de $\mathcal{Q}$, et les morphismes de $\mathcal{C}_\mathcal{Q}$ les chemins dans $\mathcal{Q}$, alors l'algèbre des morphismes de $\mathcal{C}_\mathcal{Q}$ coïncide avec l'algèbre des chemins de $\mathcal{Q}$. On peut définir la cohomologie de Hochschild d'une catégorie $\mathcal{C}$ comme la cohomologie de Hochschild de l'algèbre $k\mathcal{C}$. Bendiffalah et Guin ont étudié dans [BG] la cohomologie des catégories *musclées*. La suite spectrale construite à la section 4 permet de calculer la cohomologie des catégories dont l'algèbre des morphismes est triangulaire. Ces deux situations coïncident pour une catégorie *muscle*, dont l'algèbre est triangulaire de taille 2.

Références

- [BG] B. BENDIFFALAH et D. GUIN, *Cohomologie de diagrammes d'algèbres triangulaires*, prépublication 1999/04, Université de Montpellier 2.
- [C1] C. CIBILS, *Tensor Hochschild homology and cohomology*, Interaction between ring theory and representations of algebras (Murcia), Lecture Notes in Pure and Appl. Math., 210, Dekker, New York, 35-51 (2000).

- [C2] **C. CIBILS**, *Complexes simpliciaux et carquois*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, Série I, t. 307, No. 19, 929-934 (1988).
- [CMRS] **C. CIBILS, E. MARCOS, M.J. REDONDO, A. SOLOTAR** *Cohomology of split algebras and of trivial extensions*, preprint.
- [GS1] **M. GERSTENHABER** et **S. SCHACK**, *Relative Hochschild cohomology, rigid algebra, and the bockstein*, Journal of Pure and Applied Algebra 43, 53-74 (1986).
- [GS2] **M. GERSTENHABER** et **S. SCHACK**, *Algebraic Cohomology and Deformation Theory*, Deformation of Algebras and Structures and Applications, M. Hazewinkel and M. Gerstenhaber (eds.), Kluwer, 11-264 (1988).
- [GS3] **M. GERSTENHABER** et **S. SCHACK**, *Simplicial cohomology is Hochschild cohomology*, Journal of Pure and Applied Algebra 30, 143-156 (1983).
- [GG] **J.A. GUCCIONE, J.J. GUCCIONE**, *Hochschild Cohomology of Triangular Matrix Algebras*, preprint.
- [MP] **S. MICHELENA, M.I. PLATZECK**, *Hochschild Cohomology of Triangular Matrix Algebras*, Journal of Algebra 233, 502-525 (2000).
- [NT] **R. NEST** et **B. TSYGAN**, *On the cohomology ring of an algebra*, Advances in geometry. Boston, MA : Birkhaeuser. Prog. Math. 172, 337-370 (1999).
- [W] **Ch. WEIBEL**, *An introduction to homological algebra*, Cambridge studies in advanced mathematics 38 (1994).